



治療を受けられる患者様・御家族様の方へ

患者氏名() 主治医() 受け持ち看護師署名()

月日 経過	治療前日	治療前(当日)	治療後(当日)
目的	治療によって精神症状を改善します		
内服	いつもと同じです 	治療の時間や場合によって中止になったり、延期になる事があります。 朝食後薬内服 ・する ・しない ・治療後にする 昼食後薬内服 ・する ・しない ・治療後にする	再開され、いつもと同じになります。 
注射	ありません	点滴を始めます 	点滴が終了したら ・ルートを抜きます ・ルートを残します
処置	特にありません	入れ歯、メガネ、時計、指輪や胸を締め付けるようなブラジャーなどは外しておいて下さい。また、ヘアピン等も外しておいて下さい。	治療後、医師の指示により2~3時間酸素吸入をします。
検査	初回のみ治療前日までにレントゲン・心電図検査・麻酔科医の診察があります。	特にありません	特にありません
活動	出来れば入浴・シャワーをして下さい。 	治療前にトイレを済ませてベッド上で安静にして過ごして下さい。施行直前に術衣に着替えます。 	麻酔から覚醒した後は、いつもどおりに過ごして下さい。 
食事	夕食以降は、 ・何も食べないで下さい ・通常と同じです 水分は()時まで飲めます。 	朝食は ・治療が終了するまでお待ちください ・通常どおり摂取してください。 食事以外は摂取しないで下さい 昼食は ・治療が終了するまでお待ちください ・通常どおり摂取してください。 水分は()時以降は治療終了までお待ち下さい。内服は少量の水でして下さい。	食事・飲水は治療終了し、麻酔から覚醒後に医師の指示で始まります。以降は通常と同じです。 