


バリコ（顕微鏡下精索静脈瘤結紮術）を受ける患者様へ

様

	入院（手術前日） 月 日	手術日 手術前 月 日	手術後	退院（術後 1 日目） 月 日
目標	手術を理解し、必要な準備が出来る。		合併症が早期に発見され、苦痛を軽減することが出来る。	手術後合併症なく過ごすことが出来る。
処置 検査	毛剃り（恥骨～鼠径部）を看護師でします。	手術前 ストッキングを履いて、眼鏡や入れ歯、指輪などの金属類を外してください。 8 時 30 分の手術の場合 8 時 20 分 4 階の手術室へ向かいます。 時間未定の手術の場合 手術前に点滴の針を入れます。 手術時間が決まれば、4 階の手術室へ向かいます。	<体の状態> 酸素のマスク、心電図、点滴、フットポンプが付きます。 6～8 時間毎に体温と血圧を測ります。	熱が無ければ点滴の針を抜きます。 医師の診察後、問題が無ければ退院となります。
点滴 内服	寝る前に下剤（センノシド）の内服があります。	7 時まで、麻酔科の指示が出たお薬を少量の水で内服してください。 時間未定の手術の場合、手術前に点滴をします。	点滴は夕方頃に終わります。 	
活動	制限はありません。		ベッド上安静です。安静の間は、尿器を使用し排尿を行います。 横向きは出来ますが、起き上がりは出来ません。 手術後 3 時間を経過すれば、制限はありません。 最初の歩行は看護師と共に行います。	
食事	夕食以降は食べることが出来ません。 24 時まで飲水可能です。	0 時以降食べたり飲んだり出来ません。	食べることは出来ません。 酸素のマスクを外した後、飲水が出来ます。	
清潔	処置後、シャワーに入ってください。		うがいの希望があれば、お手伝いします。	シャワーは退院後より入れます。 入浴は術後 3 日目より入れます。
説明	治療日程や、術前の必要物品、術後の安静について説明します。	ご家族は病室かデイルームでお待ち下さい。 それ以外の場所で待機する場合は、連絡先を看護師に教えてください。 貴重品はご家族に預けてください。	ご家族の方が夜間付き添いをされる場合、貸出寝具を用意します。 尿意が強い、傷が痛いなどの症状があれば、すぐにお知らせください。	