

甲状腺癌放射性ヨード内用療法を受けられる患者様へ (2回目以降治療用)

お名前:

主治医:

受け持ち看護師:

	一般入院						管理区域の入院				退院 月 日()
	入院4週間前 月 日()	入院2週間前 月 日()	入院1日目 月 日()	2日目 月 日()	3日目 月 日()	4日目 月 日()	5日目 月 日()	6日目 月 日()	7日目 月 日()	8日目 月 日()	
説明・指導		甲状腺ホルモンの休薬開始	14時までに来院してください 入院手続きに必要な書類を提出してください ・入院診療計画書をお渡しします				放射性ヨード内服前に入浴、洗髪、更衣換え、用便をします 管理区域へ移ります	体外計測終了後に管理区域から出る許可が出てから、入浴、洗髪、更衣換えをします。		治療結果と今後の治療方針を説明いたします	退院の準備 ・退院後の指導 ・退院療養計画書をお渡しします ・内服薬をお渡しします ・費用の精算
食事・活動		ヨード制限開始	ヨード制限食						普通食(ヨード制限なし)		
			食堂での食事				病室での食事(夕食～)	食堂での食事(体外計測終了後に管理区域から出る許可が出てから)			
検査・治療			<input type="checkbox"/> 胸部X線検査 <input type="checkbox"/> 心電図検査	<input type="checkbox"/> 血液検査			<input type="checkbox"/> 血液検査 <input type="checkbox"/> 放射性ヨードを内服します(午後) <input type="checkbox"/> 内服1時間後に体外計測(体内にある放射エネルギーを測定すること)を行います	<input type="checkbox"/> 体外計測	<input type="checkbox"/> 体外計測	<input type="checkbox"/> I-131シンチグラフィ検査(診断のために放射性ヨードの全身への広がりを観察します) <input type="checkbox"/> 持ち物の放射線測定をします(放射エネルギーが高いものについては、しばらくお預かり、もしくは廃棄させていただくことがあります)	
内服薬	甲状腺ホルモンの変更(チラーヂンSを内服している方のみ)	甲状腺ホルモン休薬開始	ホルモン休薬により便秘がちになることがありますので、必要に応じて下剤を内服します			夕食後より甲状腺ホルモン再開	吐き気止めを内服します(吐き気の強い時は注射薬を使うこともあります)				
									症状に応じて痛み止めを内服します		